



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНЗДРАВ РОССИИ)



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Москва
Регистрационный № 77708

от 01 августа 2024.

27 марта 2024г.

№ 143н

Об утверждении классификации природных лечебных ресурсов, указанных в пункте 2 статьи 2¹ Федерального закона от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», их характеристик и перечня медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации с применением таких природных лечебных ресурсов

В соответствии с пунктом 3 статьи 2¹, статьей 4 Федерального закона от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», частью 5 статьи 40 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», подпунктами 5.2.35 и 5.2.196 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые:

классификацию природных лечебных ресурсов, указанных в пункте 2 статьи 2¹ Федерального закона от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», их характеристики согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

перечень медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации с применением природных лечебных ресурсов, указанных в пункте 2 статьи 2¹ Федерального закона от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 1029н «Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2020 г., регистрационный № 60589);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 октября 2022 г. № 664н «О внесении изменения в приложение № 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 1029н

«Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 ноября 2022 г., регистрационный № 71058);


приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 557н «Об утверждении классификации природных лечебных ресурсов, медицинских показаний и противопоказаний к их применению в лечебно-профилактических целях» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2021 г., регистрационный № 65177);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 марта 2022 г. № 207н «О внесении изменений в классификацию природных лечебных ресурсов, утвержденную приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 557н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 апреля 2022 г., регистрационный № 68239);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 апреля 2023 г. № 193н «О внесении изменений в приложение № 1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 1029н «Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения» и в приложение № 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 557н «Об утверждении классификации природных лечебных ресурсов, медицинских показаний и противопоказаний к их применению в лечебно-профилактических целях» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2023 г., регистрационный № 73651).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 г.

Министр



М.А. Мурашко

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 2 СТАТЬИ 2.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 23 ФЕВРАЛЯ 1995 Г. N 26-ФЗ "О ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСАХ, ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЯХ И КУРОРТАХ", ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

I. Общие положения

1. Классификация природных лечебных ресурсов (далее - классификация) осуществляется по уникальности, категориям, подкатегориям, подклассам, группам, подгруппам, типам, подтипам, видам, подвидам и разновидностям природных лечебных ресурсов, используемых при санаторно-курортном лечении и медицинской реабилитации.
2. Природные лечебные ресурсы, представленные на территории Российской Федерации, классифицируются как уникальные при наличии хотя бы одного из следующих признаков:

представлены единственными в своем роде природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации;

не имеют аналогов по химическому составу и (или) агрегатному состоянию на территории Российской Федерации;

обладают исключительными лечебными свойствами, подтвержденными научными исследованиями, в том числе с учетом результатов соответствующей многолетней практики.

II. Минеральные воды

3. Минеральные воды классифицируются по категориям, подкатегориям, группам, подгруппам.
4. В зависимости от целевого назначения минеральные воды классифицируются по категориям:

для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения;

питьевые.
5. В зависимости от совокупности показателей общей минерализации и содержания

биологически активных компонентов в воде источника (скважины) минеральные воды, относящиеся к категории минеральных питьевых вод, классифицируются по подкатегориям:

лечебно-столовые (минерализация от 1 г/куб. дм, но не более 10 г/куб. дм или минерализация менее 1 г/куб. дм при наличии биологически активных компонентов, массовая концентрация которых соответствует показателям, приведенным в абзацах восьмом - четырнадцатом пункта 6 классификации);

лечебные (минерализация от 10 г/куб. дм, но не более 15 г/куб. дм, или минерализация менее 10 г/куб. дм при наличии биологически активных компонентов, массовая концентрация которых соответствует показателям, приведенным в абзацах двенадцатом - шестнадцатом пункта 6 классификации).

6. В зависимости от основных бальнеологических показателей лечебной значимости минеральные воды классифицируются по группам:

без специфических компонентов и свойств (лечебно-профилактическое значение которых определяется основным ионно-солевым составом воды в источнике (скважине) и значением минерализации (минеральные воды для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения от 10,0 г/куб. дм и более, подготовленные для лечебных процедур, лечебно-столовые минеральные питьевые воды от 1,0 г/куб. дм, но не более 10,0 г/куб. дм, лечебные минеральные питьевые воды от 10,0 г/куб. дм, но не более 15,0 г/куб. дм);

поликомпонентного состава (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием нескольких биологически активных компонентов в воде источника (скважины) (при соответствии массовой концентрации биологически активных компонентов показателям, приведенным в абзацах четвертом - шестнадцатом настоящего пункта, для конкретной категории и (или) подкатегории минеральных вод);

сероводородные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием свободного сероводорода и гидросульфидного иона, массовая концентрация которых в воде источника (скважины) 10,0 мг/куб. дм и более (минеральные воды для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения);

радоновые (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием радона, массовая концентрация которого в воде источника (скважины) 5,0 нКи/куб. дм (185,0 Бк/куб. дм) и более (минеральные воды для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения);

кремнистые термы (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием кремния, массовая концентрация которого (в пересчете на метакремниевую кислоту) в воде источника (скважины) 50,0 мг/куб. дм и более, при температуре 35,0 градусов Цельсия и более (минеральные воды для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения);

кислые рудничные (лечебно-профилактическое значение которых определяется низким (5,0 единиц и менее) значением реакции среды (рН) и содержанием, в том числе железа, алюминия, меди и других металлов в воде источника (скважины) (минеральные воды для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения);

углекислые (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием

свободного диоксида углерода (растворенного), массовая концентрация которого в минеральной воде источника (скважины) для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения составляет 700,0 мг/куб. дм и более, а в лечебно-столовой минеральной питьевой воде составляет 500,0 мг/куб. дм и более);

железистые (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием железа суммарного, массовая концентрация которого в лечебно-столовой минеральной питьевой воде источника (скважины) составляет 10,0 мг/куб. дм и более);

слабокремнистые (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием кремния, массовая концентрация которого (в пересчете на метакремниевую кислоту) в воде источника (скважины) составляет от 25,0 мг/куб. дм, но не более 50,0 мг/куб. дм в упакованных лечебно-столовых минеральных питьевых водах, не имеющих специальные медицинские показания к применению в лечебно-профилактических целях при отсутствии других классификационных показателей);

кремнистые (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием кремния, массовая концентрация которого (в пересчете на метакремниевую кислоту) в лечебно-столовой минеральной питьевой воде источника (скважины) составляет 50,0 мг/куб. дм и более);

йодные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием йода, массовая концентрация которого в минеральной воде источника (скважины) для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения, составляет 5,0 мг/куб. дм и более, в лечебно-столовой минеральной питьевой воде составляет от 5,0 мг/куб. дм, но не более 10,0 мг/куб. дм, а в лечебной минеральной питьевой воде составляет более 10,0 мг/куб. дм);

борные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием бора, массовая концентрация которого (в пересчете на ортоборную кислоту) в минеральной воде источника (скважины) для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения составляет 35 мг/куб. дм и более, в лечебно-столовой минеральной питьевой воде составляет от 35,0 мг/куб. дм, но не более 100,0 мг/куб. дм, а в лечебной минеральной питьевой воде составляет более 100,0 мг/куб. дм);

содержащие органические вещества (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием органических веществ, массовая концентрация которых в лечебно-столовой минеральной питьевой воде источника (скважины) в расчете на углерод составляет от 5,0 мг/куб. дм, но не более 15,0 мг/куб. дм, а в лечебной минеральной питьевой воде составляет более 15,0 мг/куб. дм);

бромные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием брома, массовая концентрация которого в минеральной воде для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения и в лечебной минеральной питьевой воде источника (скважины) составляет 25,0 мг/куб. дм и более);

мышьяковистые (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием природного биологически активного мышьяка, массовая концентрация которого в минеральной воде источника (скважины) для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения составляет 0,7 мг/куб. дм упакованной лечебной минеральной питьевой воде составляет от 0,7 мг/куб. дм, но не более 5,0 мг/куб. дм,

а в нативной (неупакованной) лечебной минеральной питьевой воде составляет от 0,7 мг/куб. дм, но не более 20,0 мг/куб. дм.

7. В зависимости от соотношения ионов основного ионно-солевого состава (реже других ионов), значения минерализации, содержания спонтанных (растворенных) газов, мышьяка, железа, значения радиоактивности (радона), показателей реакции среды (далее - pH) и температуры воды в источнике (скважине), зависящих от реально существующих в природе естественных факторов их формирования (геохимических закономерностей, структурно-тектонической обстановки, литолого-фациального состава водовмещающих пород), минеральные воды классифицируются по подгруппам, указанным в пунктах 8 - 16 настоящей классификации.

8. В зависимости от содержания ионов основного ионно-солевого состава (реже других ионов) воды в источнике (скважине) минеральные воды классифицируются по подгруппам.

Классификация осуществляется начиная от ионов, содержащихся в меньшей концентрации, к ионам, содержащимся в большей концентрации, при этом содержание отдельных ионов основного ионно-солевого состава (реже других ионов) должно составлять не менее 20 процент-эквивалент (далее - %-экв.).

9. В зависимости от значения минерализации минеральные воды классифицируются по подгруппам:

пресные - не более 1,0 г/куб. дм;

слабоминерализованные - свыше 1,0 г/куб. дм, но не более 2,0 г/куб. дм;

маломинерализованные - свыше 2,0 г/куб. дм, но не более 5,0 г/куб. дм;

среднеминерализованные - свыше 5,0 г/куб. дм, но не более 10,0 г/куб. дм;

высокоминерализованные - свыше 10,0 г/куб. дм, но не более 35,0 г/куб. дм;

рассольные (рассолы) - свыше 35,0 г/куб. дм, но не более 150,0 г/куб. дм;

крепкие рассольные (крепкие рассолы) - свыше 150,0 г/куб. дм, но не более 350,0 г/куб. дм;

очень крепкие (ультракрепкие) рассольные (ультракрепкие рассолы) - свыше 350,0 г/куб. дм.

10. В зависимости от содержания свободного диоксида углерода (растворенного) в воде источника (скважины) минеральные воды дополнительно классифицируются по подгруппам:

слабоуглекислые - от 0,5 г/куб. дм, но не более 1,4 г/куб. дм;

углекислые средней концентрации - свыше 1,4 г/куб. дм, но не более 2,5 г/куб. дм;

сильноуглекислые - свыше 2,5 г/куб. дм.

11. В зависимости от содержания сероводорода общего ($H_2S + HS^-$) в воде источника (скважины) минеральные воды дополнительно классифицируются по подгруппам:

слабосероводородные - от 10 мг/куб. дм, но не более 50 мг/куб. дм;

сероводородные средней концентрации - свыше 50 мг/куб. дм, но не более 100 мг/куб. дм;

крепкие сероводородные - свыше 100 мг/куб. дм, но не более 250 мг/куб. дм;

очень крепкие сероводородные - свыше 250 мг/куб. дм, но не более 500 мг/куб. дм;

ультракрепкие сероводородные - свыше 500 мг/куб. дм.

В зависимости от значения показателя реакции среды (рН) в скобках приводится дополнительная классификационная характеристика:

при рН менее 6,5 единиц - сероводородные;

при рН от 6,5 единиц, но не более 7,5 единиц - сероводородно-гидросульфидные;

при рН свыше 7,5 единиц - гидросульфидные.

12. В зависимости от содержания мышьяка в воде источника (скважины) минеральные воды дополнительно классифицируются по подгруппам:

мышьяковистые (мышьяковые) - мышьяк в концентрации от 0,7 мг/куб. дм, но не более 5,0 мг/куб. дм;

крепкие мышьяковистые (крепкие мышьяковые) - мышьяк в концентрации свыше 5,0 мг/куб. дм, но не более 10,0 мг/куб. дм;

очень крепкие мышьяковистые (очень крепкие мышьяковые) - мышьяк в концентрации свыше 10,0 мг/куб. дм.

13. В зависимости от содержания железа в воде источника (скважины) минеральные воды дополнительно классифицируются по подгруппам:

железистые - железо суммарное в концентрации от 10,0 мг/куб. дм, но не более 40,0 мг/куб. дм;

крепкие железистые - железо суммарное в концентрации свыше 40,0 мг/куб. дм, но не более 100,0 мг/куб. дм;

очень крепкие железистые - железо суммарное в концентрации свыше 100,0 мг/куб. дм.

14. В зависимости от значения радиоактивности (радона) в воде источника (скважины) минеральные воды дополнительно классифицируются по подгруппам:

очень слаборадоновые - от 5 нКи/куб. дм, но не более 20 нКи/куб. дм (от 185 Бк/куб. дм, но не более 740 Бк/куб. дм);

слаборадоновые - свыше 20 нКи/куб. дм, но не более 40 нКи/куб. дм (свыше 740 Бк/куб. дм, но не более 1480 Бк/куб. дм);

радоновые средней концентрации - свыше 40 нКи/куб. дм, но не более 200 нКи/куб. дм (свыше 1480 Бк/куб. дм, но не более 7400 Бк/куб. дм);

высокоррадоновые - свыше 200 нКи/куб. дм (свыше 7400 Бк/куб. дм).

15. В зависимости от значения показателя реакции среды (рН) в воде источника (скважины) минеральные воды дополнительно классифицируются по подгруппам:

сильнокислые - менее 3,5 единиц;

кислые - от 3,5 единиц, но не более 5,5 единиц;

слабокислые - свыше 5,5 единиц, но не более 6,8 единиц;

нейтральные - свыше 6,8 единиц, но не более 7,2 единиц;

слабощелочные - свыше 7,2 единиц, но не более 8,5 единиц;

щелочные - свыше 8,5 единиц.

16. В зависимости от значения температуры в воде источника (скважины) минеральные воды дополнительно классифицируются по подгруппам:

исключительно холодные (переохлажденные) - менее 0 градусов Цельсия;

очень холодные - от 0 градусов Цельсия, но не более 4 градусов Цельсия;

холодные - свыше 4 градусов Цельсия, но не более 20 градусов Цельсия;

теплые (слаботермальные) - свыше 20 градусов Цельсия, но не более 35 градусов Цельсия;

горячие (термальные) - свыше 35 градусов Цельсия, но не более 42 градусов Цельсия;

очень горячие (высокотермальные) - свыше 42 градусов Цельсия, но не более 100 градусов Цельсия;

исключительно горячие (перегретые) - свыше 100 градусов Цельсия.

III. Лечебные грязи

17. Лечебные грязи классифицируются по типам, подтипам, видам, подвидам, разновидностям.

18. В зависимости от происхождения лечебные грязи классифицируются по типам:

торфяные (болотные отложения торфов высокой степени разложения (процент от органического вещества 40% и более), преимущественно органического состава (содержание органических веществ - 50% и более от сухого вещества);

сапропелевые (иловые отложения преимущественно пресных водоемов, содержащие 10% и более в значительной степени разложившихся органических веществ растительного и животного происхождения (процент от сухого вещества);

иловые минеральные (сульфидные) (иловые отложения преимущественно соленых водоемов, содержащие менее 10% органических веществ (процент от сухого вещества), и обычно обогащенные водорастворимыми солями и сульфидами);

сопочные (глинистые образования, выбрасываемые по тектоническим трещинам газами и напорными водами, содержащие менее 5% органических веществ (процент от сухого вещества), различное количество водорастворимых солей, и иногда сульфиды).

19. В зависимости от значения минерализации грязевого раствора лечебные грязи классифицируются по подтипам:

пресноводные - менее 1 г/куб. дм;

низкоминерализованные - от 1 г/куб. дм, но не более 15 г/куб. дм;

среднеминерализованные - свыше 15 г/куб. дм, но не более 35 г/куб. дм;

высокоминерализованные - свыше 35 г/куб. дм, но не более 150 г/куб. дм;

соленащенные - свыше 150 г/куб. дм.

20. В зависимости от содержания сульфидов железа в естественной грязи лечебные грязи классифицируются по видам:

бессульфидные - менее 0,01%;

слабосульфидные - от 0,01%, но не более 0,15%;

среднесульфидные - свыше 0,15%, но не более 0,50%;

сильносульфидные - свыше 0,50%.

21. В зависимости от значения зольности (процент на сухое вещество) лечебные грязи, по типам лечебных грязей, классифицируются по подвидам:

торфяные: на низкозольные (менее 5%), среднезольные (от 5%, но не более 20%), высокозольные (свыше 20%);

сапропелевые: на низкозольные (менее 30%), среднезольные (от 30%, но не более 60%), высокозольные (свыше 60%, но не более 90%);

иловые минеральные (сульфидные): на высокозольные (90% и более);

сопочные: на высокозольные (95% и более).

22. В зависимости от значения показателя реакции среды (рН) лечебные грязи классифицируются по разновидностям:

сильнокислые - менее 2,5 единиц;

кислые - от 2,5 единиц, но не более 5,0 единиц;

слабокислые - свыше 5,0 единиц, но не более 7,0 единиц;

слабощелочные - свыше 7,0 единиц, но не более 9,0 единиц;

щелочные - свыше 9,0 единиц.

IV. Рапа лиманов и озер

23. Рапа лиманов и озер классифицируется по группам, подгруппам.

24. Рапа лиманов и озер (природный насыщенный соляной раствор, по целевому назначению относящийся к минеральным водам для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения), в зависимости от основных бальнеологических показателей лечебной значимости классифицируется по группам:

без специфических компонентов и свойств (лечебно-профилактическое значение которых определяется основным ионно-солевым составом и значением минерализации более 35 г/куб. дм);

бромные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием брома, массовая концентрация которого в рапе лиманов и озер составляет не менее 25 мг/куб. дм);

йодные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием йода, массовая концентрация которого в рапе лиманов и озер составляет не менее 5 мг/куб. дм);

йодо-бромные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием йода и

брома, массовая концентрация которых в рапе лиманов и озер составляет не менее 25 мг/куб. дм брома и не менее 5 мг/куб. дм йода);

борные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием бора, массовая концентрация которого (в пересчете на ортоборную кислоту) в рапе лиманов и озер составляет не менее 35 мг/куб. дм).

25. В зависимости от соотношения ионов основного ионно-солевого состава и значения минерализации рапа лиманов и озер классифицируется по подгруппам, указанным в пунктах 26 и 27 настоящей классификации.

26. В зависимости от соотношения ионов основного ионно-солевого состава классификация рапы лиманов и озер осуществляется по подгруппам начиная от ионов, содержащихся в меньшей концентрации, к ионам, содержащимся в большей концентрации, при этом содержание отдельных ионов основного ионно-солевого состава должно составлять не менее 20%-экв.

27. В зависимости от значения минерализации рапа лиманов и озер классифицируется по подгруппам:

рассольные (рассолы) - свыше 35,0 г/куб. дм, но не более 150,0 г/куб. дм;

крепкие рассольные (крепкие рассолы) - свыше 150,0 г/куб. дм, но не более 350,0 г/куб. дм;

очень крепкие (ультракрепкие) рассольные (ультракрепкие рассолы) - свыше 350,0 г/куб. дм.

V. Бишофит

28. Бишофит классифицируется по группам, подгруппам.

29. Бишофит (насыщенный раствор, по целевому назначению относящийся к минеральным водам для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения, по значению минерализации являющийся очень крепким (ультракрепким) рассолом (более 350,0 г/куб. дм), относящийся к подгруппе, соответствующей хлоридной магниевой подгруппе минеральных вод с содержанием хлоридов более 95%-экв., ионов магния более 90%-экв.) в зависимости от содержания биологически активных компонентов классифицируется по группам:

бромные (лечебно-профилактическое значение которого определяется наличием брома, массовой концентрацией в бишофите от 2000 мг/куб. дм, но не более 8000 мг/куб. дм);

борные (лечебно-профилактическое значение которого определяется наличием бора, массовой концентрацией (в пересчете на ортоборную кислоту) в бишофите от 500 мг/куб. дм, но не более 2000 мг/куб. дм).

30. В зависимости от соотношения ионов основного ионно-солевого состава бишофит классифицируется по подгруппам.

Классификация осуществляется начиная от ионов, содержащихся в меньшей концентрации, к ионам, содержащимся в большей концентрации, при этом содержание отдельных ионов основного ионно-солевого состава должно составлять не менее 20%-экв.

VI. Лечебные соли

31. Лечебные соли, приготовленные для лечебных процедур в виде раствора, классифицируются по группам, подгруппам.

32. Лечебные соли, приготовленные для лечебных процедур в виде раствора, по целевому назначению относящиеся к минеральным водам для наружного бальнеотерапевтического (в том числе для внутреннего непитьевого) применения, в зависимости от основных бальнеологических показателей лечебной значимости классифицируются по группам:

без специфических компонентов и свойств (лечебно-профилактическое значение которых определяется основным ионно-солевым составом и значением минерализации свыше 1 г/куб. дм);

бромные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием брома, массовая концентрация которого в растворе лечебных солей составляет не менее 25 мг/куб. дм);

йодные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием йода, массовая концентрация которого в растворе лечебных солей составляет не менее 5 мг/куб. дм);

йодо-бромные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием йода и брома, массовая концентрация которых в растворе лечебных солей составляет не менее 25 мг/куб. дм брома и не менее 5 мг/куб. дм йода);

борные (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием бора, массовая концентрация которого (в пересчете на ортоборную кислоту) в растворе лечебных солей составляет не менее 35 мг/куб. дм);

поликомпонентного состава (лечебно-профилактическое значение которых определяется наличием нескольких биологически активных компонентов, массовая концентрация которых в растворе лечебных солей составляет не менее 25 мг/куб. дм брома, не менее 5 мг/куб. дм йода и не менее 35 мг/куб. дм бора (в пересчете на ортоборную кислоту)).

33. В зависимости от соотношения ионов основного ионно-солевого состава и значения минерализации раствор лечебных солей классифицируется по подгруппам, указанным в пунктах 34 и 35 настоящей классификации.

34. В зависимости от соотношения ионов основного ионно-солевого состава лечебные соли, приготовленные для лечебных процедур в виде раствора, классифицируются по подгруппам.

Классификация осуществляется начиная от ионов, содержащихся в меньшей концентрации, к ионам, содержащимся в большей концентрации, при этом содержание отдельных ионов основного ионно-солевого состава должно составлять не менее 20%-экв.

35. В зависимости от значения минерализации раствор лечебных солей классифицируется по подгруппам:

высокоминерализованные - свыше 10,0 г/куб. дм, но не более 35,0 г/куб. дм;

рассолы - свыше 35,0 г/куб. дм, но не более 150,0 г/куб. дм.

VII. Лечебные природные газы

36. Природные лечебные газы классифицируются по группам.

37. Лечебные природные газы, представляющие собой геотермальные газы, близкие по

составу к атмосферному воздуху, обогащенному продуктами разложения органики, основным из которых является углекислый газ (90 - 100%) с температурой свыше 20 градусов Цельсия, но не более 105 градусов Цельсия, в зависимости от уровня относительной влажности классифицируются по группам:

влажные лечебные природные газы с относительной влажностью от 45%, но не более 100%;

сухие лечебные природные газы с относительной влажностью от 15%, но не более 45%.

VIII. Лечебный климат

38. Лечебный климат классифицируется по подклассам, группам.

39. В зависимости от многолетнего режима погоды лечебный климат классифицируется по подклассам:

приморский;

низкогорный - с высотой над уровнем моря от 500 м, но не более 1000 м;

среднегорный нижнего пояса - с высотой над уровнем моря свыше 1000 м, но не более 1500 м;

среднегорный верхнего пояса - с высотой над уровнем моря свыше 1500 м, но не более 2000 м;

высокогорный - с высотой над уровнем моря свыше 2000 м;

равнинный лесной;

равнинный лесостепной;

равнинный полупустынный.

40. В зависимости от рельефа земной поверхности, наличия водных и растительных объектов лечебный климат классифицируется по группам:

1) приморский:

климат умеренно континентальный, с чертами морского влияния, лесной зоны;

климат умеренно континентальный, с чертами морского, жаркий и сухой, степной и полупустынной равнинной зоны;

климат умеренно континентальный, с чертами морского, степной зоны;

климат морской, умеренных широт лесной зоны;

климат средиземноморский, сухих субтропиков;

климат средиземноморский, влажной субтропической зоны, предгорный;

климат средиземноморский, субтропической зоны, предгорный;

климат муссонный, умеренных широт; летом - с влажным морским воздухом лесной зоны, зимой - с континентальным, сухим воздухом лесной зоны;

2) низкогорный, с высотой над уровнем моря от 500, но не более 1000 м:

климат умеренно континентальный, низкогорных районов, лесной зоны;

климат резко континентальный, низкогорных районов, таежной зоны;

климат резко континентальный, низкогорных районов, степной зоны;

климат резко континентальный, таежной зоны;

3) среднегорный нижнего пояса, с высотой над уровнем моря свыше 1000 м, но не более 1500 м, и среднегорный верхнего пояса, с высотой над уровнем моря свыше 1500 м, но не более 2000 м:

климат умеренно континентальный, среднегорный, степной зоны;

климат умеренно континентальный, среднегорный, лесной зоны;

климат резко континентальный, среднегорный, таежной зоны;

4) равнинный лесной:

климат переходный от морского к континентальному, лесной зоны;

климат умеренно континентальный, близкий к морскому, лесной зоны;

климат умеренно континентальный, лесной зоны;

континентальный климат степей, таежной зоны;

климат резко континентальный, лесной зоны;

5) равнинный лесостепной:

климат умеренно континентальный, лесостепной зоны;

климат умеренно континентальный;

климат умеренно континентальный, предгорный;

6) равнинный полупустынный:

климат умеренно континентальный, жаркий и сухой.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ И
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ДЛЯ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ И
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ
РЕСУРСОВ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 2 СТАТЬИ 2.1
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 23 ФЕВРАЛЯ 1995 Г. N
26-ФЗ "О ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСАХ,
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЯХ И
КУРОРТАХ"**

**II. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения и
медицинской реабилитации детского населения с применением
природных лечебных ресурсов, указанных в пункте 2 статьи 2.1
Федерального закона от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ "О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах"**

N п/п	Код по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Природные лечебные ресурсы
Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при заболевании туберкулезом (I класс по МКБ-10)				
1.	A15 A17+ A19	Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически Туберкулез нервной системы Милиарный туберкулез	Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием	Лечебный климат

			сопутствующих заболеваний, в том числе после хирургического лечения	
2.	A16 B90	Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологически Последствия туберкулеза	Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии. Клинически излеченный туберкулез	Лечебный климат
3.	R76.1 Z20.1	Аномальная реакция на туберкулиновую пробу Контакт с больным или возможность заражения туберкулезом	Риск развития активного туберкулеза у детей из групп риска по туберкулезу	Лечебный климат
4.	A18 Y58.0	Туберкулез других органов Вакцина БЦЖ	Активный туберкулез любых органов и систем, кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза, осложнения после введения вакцины против туберкулеза при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии. Клинически излеченный туберкулез	Лечебный климат
Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при заболеваниях вирусными гепатитами (I класс по МКБ-10)				
5.	B18 B18.0 B18.1 B18.2 B18.8	Хронический вирусный гепатит Хронический вирусный гепатит В с дельта-агентом Хронический вирусный гепатит В без дельта-агента Хронический вирусный гепатит С Другой хронический вирусный гепатит	При отсутствии активности биохимических показателей аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы При отсутствии активности процесса	Лечебный климат Минеральные воды (питьевые), лечебный климат
Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ (класс IV по МКБ-10)				
6.	E10	Инсулинзависимый сахарный диабет	В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и	Минеральные воды (питьевые), лечебный климат

			12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I - II стадии, полиневритом	
7.	E11	Инсулиннезависимый сахарный диабет	В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный (в фазе ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I - II стадии, полиневритом	Минеральные воды (питьевые), лечебный климат
8.	E13	Другие уточненные формы сахарного диабета	В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный (в фазе ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I - II стадии, полиневритом	Минеральные воды (питьевые), лечебный климат
9.	E25 E25.0	Адреногенитальные расстройства Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов	Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов в состоянии компенсации	Лечебный климат
10.	E27 E27.1	Другие нарушения надпочечников Первичная недостаточность коры надпочечников	Первичная недостаточность коры надпочечников в состоянии компенсации	Лечебный климат
11.	E31 E31.0	Полигландулярная дисфункция Аутоиммунная полигландулярная недостаточность	Аутоиммунная полигландулярная недостаточность в состоянии компенсации	Лечебный климат
12.	E64 E64.0 E64.1	Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ Последствия белково-энергетической недостаточности Последствия недостаточности витамина А	Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ в стадии субкомпенсации.	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

	E64.2	Последствия недостаточности витамина С		
	E64.3	Последствия рахита	Рахитические искривления	
	E64.8	Последствия недостаточности других витаминов		
13.	E66 E66.0 E66.1 E66.2 E66.8	Ожирение Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией Другие формы ожирения	Ожирение I - III степени: первичное: экзогенно-конституциональное, алиментарное; вторичное: церебральное, гипоталамическое, гипофизарное и другие. Ожирение III и IV степени	Лечебный климат
14.	E84 E84.0 E84.1 E84.8	Кистозный фиброз Кистозный фиброз с легочными проявлениями Кистозный фиброз с кишечными проявлениями Кистозный фиброз с другими проявлениями	Кистозный фиброз (в фазе ремиссии) при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени	Лечебный климат
Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с психическими расстройствами и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10)				
15.	F48 F48.8	Другие невротические расстройства Другие уточненные невротические расстройства	Невротическое расстройство, в стадии компенсации, вне обострения	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
16.	F51 F51.0 F51.1 F51.2	Расстройства сна неорганической этиологии Бессонница неорганической этиологии Сонливость [гиперсомния] неорганической этиологии Расстройство режима сна и бодрствования неорганической этиологии	Инсомния (пресомния, интрасомния и постсомния), гиперсомния, расстройство сна неорганической этиологии без выраженного нарушения общего состояния	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
17.	F95 F95.0 F95.1 F95.2	Тики Транзиторные тики Хронические моторные тики или вокализмы Комбинирование	Тики транзиторные, хронические моторные и вокализмы в стадии компенсации	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

		вокализмов и множественных моторных тиков [синдром де ла Туретта] F95.8 Другие тики		
Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями нервной системы (класс VI по МКБ-10)				
18.	G09	Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы	Последствия перенесенного менингита, менингоэнцефалита, миелита, энцефалита, энцефаломиелита без грубых интеллектуальных нарушений. Негрубые парезы и параличи, гипоталамический синдром, не ранее 3 месяцев от даты начала заболевания. Без сопутствующих соматических нарушений (осложнений) в стадии декомпенсации.	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
19.	G35	Рассеянный склероз	Без грубых интеллектуальных нарушений. Негрубые парезы и параличи, не требующие постоянного индивидуального ухода	Лечебный климат
20.	G43 G43.0 G43.1 G43.3 G43.8	Мигрень Мигрень без ауры [простая мигрень] Мигрень с аурой [классическая мигрень] Осложненная мигрень Другая мигрень	Мигрень умеренной и тяжелой степени тяжести, в фазе ремиссии не менее 3 месяцев. Мигрень любой степени тяжести, ассоциированная форма, в фазе ремиссии не менее 3 месяцев	Лечебный климат
21.	G56 G56.0 G56.1 G56.2 G56.3 G56.8	Мононевропатии верхней конечности Синдром запястного канала Другие поражения срединного нерва Поражение локтевого нерва Поражение лучевого нерва Другие мононевропатии верхней конечности	Последствия перенесенной острой невропатии срединного, локтевого, лучевого и другой невропатии верхней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
22.	G57 G57.0 G57.1 G57.2 G57.3	Мононевропатии нижней конечности Поражение седалищного нерва Мералгия парестетическая Поражение бедренного нерва Поражение бокового	Последствия перенесенной острой невропатии нижней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

	G57.4	подколенного нерва Поражение срединного подколенного нерва		
	G57.5	Синдром предплюсневоего канала		
	G57.6	Поражение подошвенного нерва		
	G57.8	Другие моновневралгии нижней конечности		
23.	G60	Наследственная и идиопатическая невропатия	Наследственные моторная и сенсорная невропатии Русси-Леви, Шарко-Мари-Тута	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	G60.0	Наследственная моторная и сенсорная невропатия		
24.	G61	Воспалительная полиневропатия	Последствия перенесенной острой полиневропатии, не ранее чем через 3 месяца от начала заболевания, без соматических осложнений	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	G61.0	Синдром Гийена-Барре		
25.	G71	Первичные поражения мышц	Без грубых двигательных нарушений, без соматических осложнений	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	G71.0	Мышечная дистрофия		
	G71.2	Врожденные миопатии		
	G71.3	Митохондриальная миопатия, не классифицированная в других рубриках		
	G71.8	Другие первичные поражения мышц		
26.	G80	Детский церебральный паралич	Детские церебральные параличи с двигательными нарушениями, соответствующими 1 - 4 уровню по шкале системы классификации больших моторных функций (далее - GMFCS), и без грубых интеллектуальных нарушений	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	G80.1	Спастическая диплегия		
	G80.2	Детская гемиплегия		
	G80.3	Дискинетический церебральный паралич		
	G80.4	Атаксический церебральный паралич		
	G80.8	Другой вид детского церебрального паралича		
27.	G81	Гемиплегия	Гемипарез с двигательными нарушениями, соответствующими 1 - 4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	G81.0	Вялая гемиплегия		
	G81.1	Спастическая гемиплегия		
28.	G82	Параплегия и тетраплегия	Парапарез и тетрапарез с двигательными нарушениями, соответствующими 1 - 4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные
	G82.0	Вялая параплегия		
	G82.1	Спастическая параплегия		
	G82.3	Вялая тетраплегия		

	G82.4	Спастическая тетраплегия	интеллектуальных нарушений	грязи
29.	G83	Другие паралитические синдромы	Парезы с двигательными нарушениями, соответствующими 1 - 4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	G83.0	Диплегия верхних конечностей		
	G83.1	Моноплегия нижней конечности		
	G83.2	Моноплегия верхней конечности		
Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10)				
30.	H01 H01.1	Другие воспаления век Неинфекционные дерматозы века	Хронические дерматозы вне обострения	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
31.	H10 H10.4 H10.5	Конъюнктивит Хронический конъюнктивит Блефароконъюнктивит	Хронические конъюнктивиты вне обострения Хронические блефароконъюнктивиты вне обострения	Лечебный климат
32.	H15 H15.0 H15.1	Болезни склеры Склерит Эписклерит	Хронический склерит в фазе ремиссии Хронический эписклерит в фазе ремиссии	Лечебный климат
33.	H16 H16.2	Кератит Кератоконъюнктивит	Хронические кератоконъюнктивиты в фазе ремиссии	Лечебный климат
34.	H20 H20.1	Иридоциклит Хронический иридоциклит	Хронический иридоциклит в фазе ремиссии	Лечебный климат
35.	H30	Хориоретинальное воспаление	Хронический хориоретинит в фазе ремиссии	Лечебный климат
36.	H52 H52.1	Нарушения рефракции и аккомодации Миопия	Прогрессирующая миопия низкой, средней степени, в том числе состояния после операции по поводу близорукости (через 1 - 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства)	Лечебный климат
37.	H55	Нистагм и другие непроизвольные движения глаз	Оптический нистагм и другие непроизвольные движения глаз	Лечебный климат
38.	Q15.0	Врожденная глаукома	Компенсированная форма	Лечебный климат
39.	S05	Травма глаза и глазницы	Состояние после проникающих ранений глаз (не ранее чем через 1 - 2 месяца после травмы) и контузий глаза (не ранее чем через 1 месяц после травмы)	Лечебный климат
Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями уха и сосцевидного отростка (класс VIII по МКБ-10)				

40.	H90.3	Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя	Хроническая стадия. По времени возникновения: врожденная или приобретенная. I - IV степень тяжести, глухота.	Лечебный климат
	H90.4	Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе	Хроническая стадия. По времени возникновения: врожденная или приобретенная. I - IV степень тяжести, глухота.	
	H90.5	Нейросенсорная потеря слуха неуточненная	Хроническая стадия. По времени возникновения: врожденная или приобретенная. I - IV степень тяжести, глухота.	
Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями системы кровообращения (класс IX по МКБ-10)				
41.	I01	Ревматическая лихорадка с вовлечением сердца	Ревматизм в неактивной фазе без порока сердца после выписки из стационара. Ревматизм в неактивной фазе (не ранее 8 - 10 месяцев после окончания атаки, рецидива) без порока сердца	Лечебный климат
42.	I05	Ревматические болезни митрального клапана	Ревматизм в неактивной фазе с умеренной полностью компенсированной изолированной недостаточностью митрального или аортального клапанов, с комбинированным митрально-аортальным пороком при компенсации или недостаточности кровообращения не выше I стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости (прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма и проводимости: пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц политопная, групповая, частая экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада II - III степени двухпучковая и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса)	Лечебный климат
43.	I06	Ревматические болезни аортального клапана		
44.	I07	Ревматические болезни трехстворчатого клапана		
45.	I08	Поражения нескольких клапанов		
46.	I09.0	Ревматический миокардит	Ревматический миокардит, неактивная фаза, при хронической	Лечебный климат

			сердечной недостаточности не выше I стадии (ФК I)	
47.	I10	Эссенциальная (первичная) гипертензия	Первичная артериальная гипертензия, I - IIБ стадии, без недостаточности кровообращения, фаза медикаментозной ремиссии	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
48.	I11.9	Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности	Лабильная артериальная гипертензия, высокое нормальное давление. Лабильная артериальная гипертензия, стадия I	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
49.	I30.0 I30.1 I30.8 I30.9	Острый неспецифический идиопатический перикардит Инфекционный перикардит Другие формы острого перикардита Острый перикардит неуточненный	Неактивная фаза, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Лечебный климат
50.	I33 I33.9	Острый и подострый эндокардит Острый эндокардит неуточненный	Неактивная фаза, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Лечебный климат
51.	I34 I34.0 I34.8	Неревматические поражения митрального клапана Митральная (клапанная) недостаточность Другие неревматические поражения митрального клапана	Недостаточность митрального клапана до II степени, аускультативная и немая формы без нарушения гемодинамики, без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости. Другие неревматические поражения митрального клапана без нарушения гемодинамики в стадии компенсации порока.	Лечебный климат
52.	I35 I35.1 I35.8	Неревматические поражения аортального клапана Аортальная (клапанная) недостаточность Другие поражения аортального клапана	Неревматические поражения аортального клапана в стадии компенсации порока. Недостаточность аортального клапана не выше II степени	Лечебный климат
53.	I40.0 I40.1 I40.8 I40.9	Инфекционный миокардит Изолированный миокардит Другие виды острого миокардита Острый миокардит неуточненный	Миокардит в фазе ремиссии, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Лечебный климат

54.	I42.0 I42.1 I42.2 I42.5 I42.7 I42.8 I42.9	Дилатационная кардиомиопатия Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия Другая гипертрофическая кардиомиопатия Другая рестриктивная кардиомиопатия Кардиомиопатия, обусловленная воздействием лекарственных средств и других внешних факторов Другие кардиомиопатии Кардиомиопатия неуточненная	Кардиомиопатия, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Лечебный климат
55.	I44.0 I44.1	Предсердно-желудочковая блокада первой степени Предсердно-желудочковая блокада второй степени	Предсердно-желудочковая блокада I и II степени, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
56.	I45.8	Другие уточненные нарушения проводимости	Синусовая брадикардия, отсутствие ХСН	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
57.	I49.1 I49.2 I49.3 I49.4	Преждевременная деполяризация предсердий Преждевременная деполяризация, исходящая из соединения Преждевременная деполяризация желудочков Другая и неуточненная преждевременная деполяризация	Экстрасистолия, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
58.	I95 I95.0 I95.1	Гипотензия Идиопатическая гипотензия Ортостатическая гипотензия	Эссенциальная гипотензия, отсутствие ХСН	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями органов дыхания (класс X по МКБ-10)				
59.	J12	Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках	Бронхопневмония в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	Лечебный климат

60.	J13	Пневмония, вызванная <i>Streptococcus pneumoniae</i>	Бронхопневмония, вызванная <i>Streptococcus pneumoniae</i> в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	Лечебный климат
61.	J14	Пневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> [палочкой Афанасьева-Пфейффера]	Бронхопневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	Лечебный климат
62.	J15 J15.0 J15.2 J15.3 J15.4 J15.5 J15.6 J15.7 J15.8	Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i> Пневмония, вызванная стафилококком Пневмония, вызванная стрептококком группы В Пневмония, вызванная другими стрептококками Пневмония, вызванная <i>Escherichia coli</i> Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями Пневмония, вызванная <i>Mycoplasma pneumonia</i> Другие бактериальные пневмонии	Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Mycoplasma pneumoniae</i> , стафилококком, стрептококком группы В и другими стрептококками (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания). Другие бактериальные пневмонии, пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	Лечебный климат
63.	J17 J17.0 J17.2 J17.3	Пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках Пневмония при микозах Пневмония при паразитарных болезнях	Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках: коклюше, микозах, паразитарных болезнях в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	Лечебный климат
64.	J41	Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит	Рецидивирующий бронхит, хронический бронхит, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	Лечебный климат
65.	J43	Эмфизема	Синдром Мак-Леода, эмфизема	Лечебный климат

	J43.0	Синдром Мак-Леода	легких, в том числе при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	
66.	J44 J44.8	Другая хроническая обструктивная легочная болезнь Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь	Хронический обструктивный бронхит неспецифического характера: в фазе неполной ремиссии, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени; в фазе полной ремиссии	Лечебный климат
67.	J45	Астма	Бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная контролируемая, частично контролируемая и интермиттирующая при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	Лечебный климат (исключая расположенные во влажной субтропической зоне)
Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями органов пищеварения (класс XI по МКБ-10)				
68.	K20	Эзофагит	Пептический эзофагит, легкой и средней тяжести, фаза полной ремиссии	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
69.	K21 K21.0 K21.9	Гастроэзофагеальный рефлюкс Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита	Гастроэзофагеальный рефлюкс, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии	Минеральные воды (питьевые)
70.	K22 K22.0 K22.1	Другие болезни пищевода Ахалазия кардиальной части Язва пищевода	Ахалазия кардиальной части пищевода, легкой и средней степени тяжести, без осложнений, фаза ремиссии	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
71.	K25	Язва желудка	Язва желудка, неосложненная форма, фаза клинико-эндоскопической ремиссии	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
72.	K26	Язва двенадцатиперстной кишки	Язва двенадцатиперстной кишки неосложненной формы, фаза клинико-эндоскопической ремиссии	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
73.	K29 K29.3 K29.8	Гастрит и дуоденит Хронический поверхностный гастрит Дуоденит	Гастрит и дуоденит легкой, средней степени тяжести, фаза ремиссии	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
74.	K52 K52.2	Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит	Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит легкой, средней степени тяжести, фаза ремиссии	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
75.	K58	Синдром раздраженного	Синдром раздраженного кишечника	Минеральные воды

	K58.9	кишечника Синдром раздраженного кишечника без диареи	без диареи, фаза ремиссии, с запором легкой и средней степени тяжести	(питьевые)
76.	K59 K59.0	Другие функциональные кишечные нарушения Запор	Другие функциональные кишечные нарушения средней степени тяжести	Минеральные воды (питьевые)
77.	K73 K73.0 K73.1	Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках	Хронический гепатит, при отсутствии активности процесса при нормальных показателях уровня тканевых ферментов или незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени	Минеральные воды (питьевые)
78.	K74 K74.0 K74.1 K74.3	Фиброз и цирроз печени Фиброз печени Склероз печени Первичный билиарный цирроз	Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при регрессирующем течении (без желтухи, при нормальных показателях трансаминаз, билирубина) и признаков печеночной недостаточности	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
79.	K76 K76.0	Другие болезни печени Жировая дегенерация печени, не классифицированная в других рубриках	Жировая дегенерация печени при отсутствии активности процесса	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
80.	K80 K80.1 K80.2 K80.5	Желчнокаменная болезнь [холелитиаз] Камни желчного пузыря с другим холециститом Камни желчного пузыря без холецистита Камни желчного протока без холангита или холецистита	Желчнокаменная болезнь без приступов колики желчного пузыря, неосложненная форма, не требующая хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), вне фазы обострения	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
81.	K81 K81.1	Холецистит Хронический холецистит	Хронический холецистит при отсутствии активности воспалительного процесса	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
82.	K82 K82.8	Другие болезни желчного пузыря Другие уточненные болезни желчного пузыря	Спайки пузырного протока, желчного пузыря Дискинезия пузырного протока, желчного пузыря	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
83.	K86 K86.1	Другие болезни поджелудочной железы Другие хронические	Хронический панкреатит, вне периода обострения при отсутствии активности воспалительного	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи

		панкреатиты	процесса, без склонности к частым	
84.	K90	Нарушения всасывания в кишечнике	Состояние после хирургического вмешательства на	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
	K91.2	Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках	желудочно-кишечном тракте (желудке, желчном пузыре, кишечнике) не ранее 2-х месяцев после операции при	
	K91.5	Постхолестистэктомический синдром	удовлетворительном состоянии	
Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями кожи и подкожной клетчатки (класс XII по МКБ-10)				
85.	L40	Псориаз	Псориаз вне обострения.	Минеральные воды (для наружного
	L40.0	Псориаз обыкновенный	Псориаз зимней формы в летнее	бальнеотерапевтического
	L40.1	Генерализованный пустулезный псориаз	время года	применения), лечебный
	L40.2	Акродерматит стойкий [Аллопо]		климат, лечебные грязи,
	L40.3	Пустулез ладонный и подошвенный		лечебные природные
	L40.4	Псориаз каплевидный		газы
	L40.8	Другой псориаз		
86.	L63	Гнездная алоpecia	Алоpecia, фаза ремиссии	Лечебный климат
	L63.0	Алоpecia тотальная		
	L63.1	Алоpecia универсальная		
	L63.2	Гнездная плешивость (лентовидная форма)		
	L63.8	Другая гнездная алоpecia		
87.	L85	Другие эпидермальные утолщения	Ихтиоз, кератоз (кератодермия) легкой и средней степени тяжести, кроме грибковых поражений	Минеральные воды (для наружного
	L85.0	Приобретенный ихтиоз		бальнеотерапевтического
	L85.1	Приобретенный кератоз [кератодермия]		применения)
	L85.2	Кератоз точечный (ладонный-подошвенный)		
	L85.3	Ксероз кожи		
	L85.8	Другие уточненные эпидермальные утолщения		
88.	L91	Гипертрофические изменения кожи	Келоидный рубец, другие гипертрофические изменения кожи	Минеральные воды (для наружного
	L91.0	Келоидный рубец		бальнеотерапевтического
	L91.8	Другие гипертрофические изменения кожи		применения)
89.	L94	Другие локализованные изменения соединительной ткани	Склеродермия (кроме системных форм), фаза ремиссии	Минеральные воды (для наружного
	L94.0	Локализованная		бальнеотерапевтического
				применения), лечебные

	L94.1 L94.8	склеродермия [morphea] Линейная склеродермия Другие уточненные локализованные изменения соединительной ткани		гряды
Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10)				
90.	B91	Последствия полиомиелита	Последствия полиомиелита в резидуальном периоде с наличием негрубых вялых парезов, не требующих постоянного индивидуального ухода	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные гряды
91.	M02 M02.2 M02.3 M02.8	Реактивные артропатии Постиммунизационная артропатия Болезнь Рейтера Другие реактивные артропатии	Реактивные артропатии, неактивная фаза инфекционного процесса	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные гряды
92.	M07 M07.0 M07.1 M07.2 M07.3	Псориатические и энтеропатические артропатии Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия Мутилирующий артрит Псориатический спондилит Другие псориатические артропатии	Артропатии, артрит: дистальный межфаланговый, олигоартрит, псориатический спондилит, активность заболевания не выше I степени, функциональная недостаточность суставов не выше II степени, без висцеритов, ограниченный псориаз, стационарная стадия	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные гряды
93.	M08 M08.0 M08.1 M08.2 M08.3 M08.4 M08.8	Юношеский (ювенильный) артрит Юношеский ревматоидный артрит Юношеский анкилозирующий спондилит Юношеский артрит с системным началом Юношеский полиартрит (серонегативный) Пауциартикулярный юношеский артрит Другие юношеские артриты	Без висцеритов, активность заболевания не выше I степени, при условии самостоятельного самообслуживания и передвижения	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные гряды
94.	M33 M33.0	Дерматополимиозит Юношеский дерматомиозит	Фаза ремиссии	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные гряды
95.	M36	Системные поражения соединительной ткани при болезнях,	Фаза ремиссии	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического

	M36.2	классифицированных в других рубриках Артропатия при гемофилии		применения)
96.	M40 M40.0 M40.1 M40.2 M40.3 M40.4	Кифоз и лордоз Кифоз позиционный Другие вторичные кифозы Другие и неуточненные кифозы Синдром прямой спины Другие лордозы	Кифозы, лордозы I, II степени	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)
97.	M41 M41.0 M41.1 M41.2 M41.3 M41.5 M41.8	Сколиоз Инфантильный идиопатический сколиоз Юношеский идиопатический сколиоз Другие идиопатические сколиозы Торакогенный сколиоз Прочие вторичные сколиозы Другие формы сколиоза	Сколиозы I, II, III степени	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)
98.	M42 M42.0	Остеохондроз позвоночника Юношеский остеохондроз позвоночника	Болезнь Шейермана, болезнь Кальве, фаза ремиссии	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
99.	M91 M91.0 M91.1 M91.3 M91.8	Юношеский остеохондроз бедра и таза Юношеский остеохондроз таза Юношеский остеохондроз головки бедренной кости [Легга-Кальве-Пертеса] Псевдококсалгия Другие юношеские остеохондрозы бедра и таза	Болезнь Легга-Кальве-Пертеса и иные остеохондрозы бедра и таза, фаза ремиссии	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
100.	M92 M92.0 M92.1 M92.2 M92.3	Другие юношеские остеохондрозы Юношеский остеохондроз плечевой кости Юношеский остеохондроз лучевой кости и локтевой кости Юношеский остеохондроз кисти Другой юношеский остеохондроз верхних конечностей	Болезнь Шлаттера, Келлера, Шинца и иные юношеские остеохондрозы	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

	M92.4	Юношеский остеохондроз надколенника		
	M92.5	Юношеский остеохондроз большой и малой берцовых костей		
	M92.6	Юношеский остеохондроз предплюсны		
	M92.7	Юношеский остеохондроз плюсны		
	M92.8	Другой уточненный юношеский остеохондроз		
Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями мочеполовой системы (класс XIV по МКБ-10)				
101.	N03	Хронический нефритический синдром	Хронический гломерулонефрит, гематурическая форма, IgA-нефропатия (болезнь Берже)	Минеральные воды (питьевые), лечебный климат
102.	N04	Нефротический синдром	Хронический гломерулонефрит, нефротическая форма, фаза стойкой клинико-лабораторной ремиссии не менее 1 года	Минеральные воды (питьевые), лечебный климат
103.	N07	Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках	Наследственный нефрит (болезнь Альпорта), болезнь тонких базальных мембран	Минеральные воды (питьевые), лечебный климат
104.	N11	Хронический тубулоинтерстициальный нефрит	Хронический тубулоинтерстициальный нефрит, необструктивный хронический пиелонефрит, хронический обструктивный пиелонефрит без нарушений уродинамики, фаза ремиссии	Минеральные воды (питьевые), лечебный климат
	N11.0	Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом		
	N11.1	Хронический обструктивный пиелонефрит		
	N11.8	Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты		
105.	N13	Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия	Рефлюкс-нефропатия, пузырно-мочеточниковый рефлюкс	Лечебный климат
	N13.0	Гидронефроз с обструкцией лоханочно-мочеточникового соединения	1 - 2 степени, аномалии мочевыводящих путей (гидронефроз, гидроуретер):	
	N13.1	Гидронефроз со стриктурой мочеточника, не классифицированный в других рубриках	неосложненные, без сопутствующего воспалительного процесса, фаза полной клинико-лабораторной ремиссии при	
	N13.2	Гидронефроз с обструкцией почки и мочеточника камнем	несущественных нарушениях уродинамики; неосложненные, без сопутствующего воспалительного	

	N13.4 N13.5 N13.7 N13.8	Гидроуретер Перегиб и стриктура мочеточника без гидронефроза Уропатия, обусловленная пузырно- мочеточниковым рефлюксом Другая обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия	процесса, без нарушений уродинамики; не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства	
106.	N 15	Другие тубулоинтерстициальные болезни почек	Кристаллурия (уратурия, оксалурия, фосфатурия, цистинурия и иные)	Минеральные воды (питьевые), лечебный климат
107.	N18 N18.8	Хроническая почечная недостаточность Другие проявления хронической почечной недостаточности	Хроническая почечная недостаточность в стадии субкомпенсации или компенсации	Лечебный климат
108.	N20 N20.0 N20.1 N20.2	Камни почки и мочеточника Камни почки Камни мочеточника Камни почек с камнями мочеточника	Мочекаменная болезнь без нарушения уродинамики, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства	Минеральные воды (питьевые), лечебный климат
109.	N30 N30.1 N30.2 N30.3	Цистит Интерстициальный цистит (хронический) Другой хронический цистит Тригонит	Хронический цистит, тригонит, фаза ремиссии	Лечебный климат
110.	N31 N31.0 N31.1 N31.2 N31.8	Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках Незаторможенный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках Рефлекторный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках Нейрогенная слабость мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках Другие нервно-мышечные дисфункции мочевого пузыря	Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря при отсутствии стойкого недержания мочи	Лечебный климат

111.	N70 N70.1	Сальпингит и оофорит Хронический сальпингит и оофорит	Хроническая стадия, фаза ремиссии	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи
112.	N71 N71.1	Воспалительные болезни матки, кроме шейки матки Хронические воспалительные болезни матки	Хронический эндометрит, фаза ремиссии	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
113.	N76 N76.1	Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы Подострый и хронический вагинит	Хронический вульвовагинит в фазе ремиссии	Лечебный климат, лечебные грязи
114.	N91 N91.0 N91.1 N91.3 N91.4	Отсутствие менструаций, скудные и редкие менструации Первичная аменорея Вторичная аменорея Первичная олигоменорея Вторичная олигоменорея	Первичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, после исключения органической патологии. Вторичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, воспалительными изменениями в матке, в том числе внутриматочными синехиями. Первичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, вследствие перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках. Вторичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, вследствие перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи
115.	N94 N94.0 N 94.3	Болевые и другие состояния, связанные с женскими половыми органами и менструальным циклом Боли в середине менструального цикла Синдром предменструального	Боли в середине менструального цикла, обусловленные функциональными причинами и последствиями воспалительных процессов органов малого таза. Синдром предменструального напряжения легкой и средней	Минеральные воды (питьевые), лечебный климат, лечебные грязи

	N94.4	напряжения Первичная дисменорея	степени тяжести, тяжелой степени. Первичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза.	
	N94.5	Вторичная дисменорея	Вторичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза	
116.	N99	Нарушения мочеполовой системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках	Перитонеальные тазовые спайки любой степени распространения после хирургических вмешательств на органах брюшной полости и малого таза	Минеральные воды (питьевые), лечебный климат, лечебные грязи
	N99.4	Послеоперационные спайки в малом тазу		
Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при врожденных аномалиях [пороках развития], деформациях и хромосомных нарушениях (класс XVII по МКБ-10)				
117.	Q21	Врожденные аномалии [пороки развития] сердечной перегородки	Врожденные аномалии (пороки развития) сердечной перегородки: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии;	Лечебный климат
	Q21.0	Дефект межжелудочковой перегородки	не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше 1 стадии	
	Q21.1	Дефект предсердной перегородки		
	Q21.2	Дефект предсердно-желудочковой перегородки		
	Q21.3	Тетрада Фалло		
	Q21.4	Дефект перегородки между аортой и легочной артерией		
	Q21.8	Другие врожденные аномалии сердечной перегородки		
118.	Q22	Врожденные аномалии [пороки развития] легочного и трехстворчатого клапанов	Врожденные аномалии (пороки развития) легочного и трехстворчатого клапанов: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии;	Лечебный климат
	Q22.2	Врожденная недостаточность клапана легочной артерии	не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии	
	Q22.3	Другие врожденные пороки клапана легочной артерии		
	Q22.5	Аномалия Эбштейна		
	Q22.6	Синдром правосторонней		

	Q22.8	гипоплазии сердца Другие врожденные аномалии трехстворчатого клапана		
119.	Q23	Врожденные аномалии [пороки развития] аортального и митрального клапанов	Врожденные аномалии (пороки развития) аортального и митрального клапанов:	Лечебный климат
	Q23.1	Врожденная недостаточность аортального клапана	после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии;	
	Q23.3	Врожденная митральная недостаточность	не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии	
	Q23.4	Синдром левосторонней гипоплазии сердца		
	Q23.8	Другие врожденные аномалии аортального и митрального клапанов		
120.	Q24	Другие врожденные аномалии [пороки развития] сердца	Другие врожденные аномалии (пороки развития) сердца:	Лечебный климат
	Q24.0	Декстрокардия	после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии;	
	Q24.1	Левокардия	не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии	
	Q24.2	Трехпредсердное сердце		
	Q24.4	Врожденный субаортальный стеноз		
	Q24.5	Аномалия развития коронарных сосудов		
	Q24.8	Другие уточненные врожденные аномалии сердца		
121.	Q32	Врожденные аномалии [пороки развития] трахеи и бронхов	Врожденные пороки развития трахеи, бронхов (врожденная трахеомалация, врожденная бронхомалация, врожденный стеноз бронхов, другие врожденные аномалии бронхов):	Лечебный климат
	Q32.0	Врожденная трахеомалация	дыхательная недостаточность не выше 2 степени;	
	Q32.1	Другие пороки развития трахеи	дыхательная недостаточность не выше I степени	
	Q32.2	Врожденная бронхомалация		
	Q32.3	Врожденный стеноз бронхов		
	Q32.4	Другие врожденные		

		аномалии бронхов		
122.	Q33	Врожденные аномалии [пороки развития] легкого	Врожденные пороки развития легких (врожденная киста легкого, секвестрация легкого, агенезия легкого, врожденная бронхоэктазия, гипоплазия и дисплазия легкого, другие врожденные аномалии легкого): дыхательная недостаточность не выше 2 степени	Лечебный климат
	Q33.0	Врожденная киста легкого		
	Q33.1	Добавочная доля легкого		
	Q33.2	Секвестрация легкого		
	Q33.3	Агенезия легкого		
	Q33.4	Врожденный бронхоэктаз		
	Q33.5	Эктопия ткани в легком		
	Q33.6	Гипоплазия и дисплазия легкого		
	Q33.8	Другие врожденные аномалии легкого		
123.	Q63	Другие врожденные аномалии [пороки развития] почки	Врожденные аномалии (пороки развития) почки, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства	Минеральные воды (питьевые)
	Q63.0	Добавочная почка		
	Q63.1	Слившаяся, дольчатая и подковообразная почка		
	Q63.2	Эктопическая почка		
	Q63.3	Гиперпластическая и гигантская почка		
	Q63.8	Другие уточненные врожденные аномалии почки		
124.	Q64	Другие врожденные аномалии [пороки развития] мочевой системы	Врожденные аномалии (пороки развития) мочевой системы, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства	Лечебный климат
	Q64.0	Эписпадия		
	Q64.1	Экстрофия мочевого пузыря		
	Q64.2	Врожденные задние уретральные клапаны		
	Q64.3	Другие виды атрезии и стеноза уретры и шейки мочевого пузыря		
	Q64.4	Аномалия мочевого протока [урахуса]		
	Q64.5	Врожденный дивертикул мочевого пузыря и мочеиспускательного		

	Q64.7	канала Другие врожденные аномалии мочевого пузыря и мочеиспускательного канала		
125.	Q65 Q65.0 Q65.1 Q65.3 Q65.4 Q65.6 Q65.8	Врожденные деформации бедра Врожденный вывих бедра односторонний Врожденный вывих бедра двусторонний Врожденный подвывих бедра односторонний Врожденный подвывих бедра двусторонний Неустойчивое бедро Другие врожденные деформации бедра	Врожденные деформации бедра не ранее чем через 6 месяцев после хирургического лечения	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
126.	Q66 Q66.0 Q66.1 Q66.2 Q66.3 Q66.4 Q66.5 Q66.6 Q66.7 Q66.8	Врожденные деформации стопы Конско-варусная косолапость Пяточно-варусная косолапость Варусная стопа Другие врожденные варусные деформации стопы Пяточно-вальгусная косолапость Врожденная плоская стопа [pes planus] Другие врожденные вальгусные деформации стопы Полая стопа [pes cavus] Другие врожденные деформации стопы	Врожденные деформации стопы не ранее чем через 6 месяцев после хирургического лечения	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
127.	Q67 Q67.5	Врожденные костно-мышечные деформации головы, лица, позвоночника и грудной клетки Врожденные деформации позвоночника	Врожденный сколиоз	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)
128.	Q77	Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника		Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического

	Q77.7	Спондилоэпифизарная дисплазия	Спондилоэпифизарная дисплазия	применения), лечебные грязи
129.	Q79	Врожденные аномалии [пороки развития] костно-мышечной системы, не классифицированные в других рубриках	Затрагивающие несколько систем без признаков декомпенсации, без сопутствующих соматических нарушений (осложнений)	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	Q79.6	Синдром Элерса-Данло		
Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин (класс XIX по МКБ-10)				
130.	S06	Внутричерепная травма	Последствия внутричерепной травмы (не ранее чем через 1 месяц после закрытой, не ранее чем через 5 - 6 месяцев после открытой); отдаленные последствия контузии мозга, травматическая энцефалопатия в восстановительном периоде при астеническом, психовегетативном и дизэнцефальном синдромах без выраженной внутричерепной и артериальной гипертензии, с нарушением двигательной функции средней или легкой степени тяжести, без эпилептиформных приступов и психических расстройств	Лечебный климат
131.	S14	Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи	Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени тяжести, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы; не ранее чем через 6 месяцев после травмы	Лечебный климат Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
132.	S24	Травма нервов и спинного	Последствия травм корешков,	Лечебный климат

		мозга в грудном отделе	сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени тяжести, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы; не ранее чем через 6 месяцев после травмы	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
133.	S34	Травма нервов и поясничного отдела спинного мозга на уровне живота, нижней части спины и таза	Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы; не ранее чем через 6 месяцев после травмы	Лечебный климат Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
134.	T88.8	Другие уточненные осложнения хирургических и терапевтических вмешательств, не классифицированные в других рубриках	Осложнения после хирургических вмешательств по поводу спинномозговых грыж, врожденных пороков развития нервной системы, доброкачественных опухолей головного и спинного мозга, с нарушением двигательной функции	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

			легкой или средней степени тяжести, без ликвородинамических расстройств, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства	
135.	T91 T91.1	Последствия травм шеи и туловища Последствия перелома позвоночника	Последствия компрессионного перелома позвоночника, не ранее чем через 1 год после травмы	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
136.	T92 T92.0 T92.1 T92.2 T92.3 T92.4 T92.5 T92.6 T92.8	Последствия травм верхних конечностей Последствие открытого ранения верхней конечности Последствие перелома верхней конечности, исключая запястье и кисть Последствие перелома на уровне запястья и кисти Последствие вывиха, растяжения и деформации верхней конечности Последствие травмы нерва верхней конечности Последствие травмы мышцы и сухожилия верхней конечности Последствие размождения и травматической ампутации верхней конечности Последствие других уточненных травм верхней конечности	Артриты и артрозы травматического происхождения. Последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате, требующие восстановления нарушенных двигательных функций	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
137.	T93 T93.0 T93.1 T93.2 T93.3 T93.4 T93.5	Последствия травм нижней конечности Последствие открытого ранения нижней конечности Последствие перелома бедра Последствие других переломов нижней конечности Последствие вывиха, растяжения и деформации нижней конечности Последствие травмы нерва нижней конечности Последствие травмы	Артриты и артрозы травматического происхождения, последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате, требующие восстановления нарушенных двигательных функций	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

		мышцы и сухожилия нижней конечности		
	T93.6	Последствие размождения и травматической ампутации нижней конечности		
	T93.8	Последствие других уточненных травм нижней конечности		
138.	T95	Последствия термических и химических ожогов и обморожений	Перенесенные обширные поверхностные и глубокие ожоги с восстановленным кожным покровом.	Минеральные воды (для наружного
	T95.0	Последствие термического и химического ожога и обморожения головы и шеи	Состояние после реконструктивно-восстановительных операций, произведенных по поводу контрактур и рубцовых стяжений.	бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	T95.1	Последствие термического и химического ожога и обморожения туловища	Состояния после восстановительных операций на сухожилиях, пластики по поводу ожогов, а также другие виды контрактур.	
	T95.2	Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности	Дерматогенные, миогенные, артрогенные контрактуры обратимого характера, возникшие после перенесенных ожогов с восстановленным кожным покровом,	
	T95.3	Последствие термического и химического ожога и обморожения нижней конечности	келоидные и гипертрофические рубцы, развившиеся на месте ожоговых ран	
	T95.4	Последствие термических и химических ожогов, классифицированных только в соответствии с площадью пораженного участка тела		
	T95.8	Последствия других уточненных термических и химических ожогов и обморожений		
	T95.9	Последствия неуточненных термических и химических ожогов и обморожений		

III. Медицинские противопоказания для санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации с применением природных лечебных ресурсов, указанных в пункте 2 статьи 21 Федерального закона от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах"

1. Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции.
2. Заболевания, передающиеся половым путем.
3. Хронические заболевания в стадии обострения.
4. Воспалительные полиартропатии, системные поражения соединительной ткани, анкилозирующий спондилит, другие уточненные спондилопатии высокой степени активности.
5. Бактерионосительство инфекционных заболеваний.
6. Заразные болезни глаз и кожи.
7. Паразитарные заболевания.
8. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки II и III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации <3>, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов.

<3> Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации".

9. Туберкулез любой локализации в интенсивную фазу лечения при наличии бактериовыделения, подтвержденного бактериоскопическим, бактериологическим или молекулярно-генетическим методами;
10. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного подтверждения в медицинской документации пациента о том, что пациент (законный представитель пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторно-курортным лечением).
11. Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том числе проведения химиотерапии.
12. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению.
13. Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организаций не психоневрологического профиля).
14. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или

нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих.

15. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.

16. Кахексия любого происхождения.

17. неизлечимые прогрессирующие заболевания и состояния, требующие оказания паллиативной медицинской помощи.

18. Заболевания и состояния, определенные по результатам научных исследований природных лечебных ресурсов, в том числе с учетом результатов соответствующей многолетней практики.